

Сравнительная характеристика показателей психоэмоционального статуса у лиц с различной интенсивностью кариеса


Кафедра терапевтической стоматологии
Кафедра ортопедической стоматологии
Гонтарь Е.А., Гаврилов А.Е.

- Есть все основания полагать, что главным патогенетическим механизмом значительной части заболеваний полости рта, относящихся к ведению стоматологов, является нейротрофическое расстройство соответствующей тканевых структур на фоне острого и хронического стресса.

- Психосоматика, по мнению А.М.Анохина, является важным разделом практической и теоретической медицины для решения проблемы причинно-следственных связей.

- В психологии существуют 4 наиболее распространенных типа темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Холерики всем известны своей вспыльчивостью, быстротой реакции на все происходящее. Меланхолики - полная противоположность холерикам - они с трудом могут постоять за себя, расстраиваются и переживают по любому поводу. Флегматики довольно безразличны ко всем происходящим событиям. Сангвиники стараются во всем найти положительную сторону и порадоваться находке.

Клиническая стоматологическая шкала



Цель данного исследования


- изучение показателя интенсивности кариеса зубов (КПУ) у молодых людей в зависимости от психологического статуса.

Материал и методика

- Было проведено обследование 31 студента стоматологического факультета в возрасте 19-20 лет. Оба пола представлены в равной степени. В ходе обследования изучали показатель интенсивности кариеса (КПУ), психологический статус с помощью опросника Айзенка. Кроме того, оценивалась и частота сердечных сокращений (ЧСС).

- Изучение психологического статуса позволило нам разбить исследуемую группу на 4 типологические подгруппы. В флегманоидную группу вошли 6 человек; в меланхолоидную - 8 человек; в сангвиноидную - 6 человек; в холероидную - 10 человек.


Оценка КПУ у обследуемых групп



Оценка КПУ у обследуемых групп

- Флегмоноидная группа - $7,4 \pm 0,02$
(среднее)
- Меланхолоидная группа - $7,6 \pm 0,05$
(среднее)
- Сангвиноидная группа - $5,1 \pm 0,04$
(низкое)
- Холероидная группа - $10,9 \pm 0,1$
(среднее)

ЧСС



ЧСС

- Флегмоноидная группа - $70,6+1,2$
- Меланхолоидная группа - $68,8+1,5$
- Сангвиноидная группа - $77,4+1,4$
- Холероидная группа - $78,6+1,8$

Вывод

- Таким образом, при анализе полученных данных четко прослеживается тенденция повышения индекса КПУ лиц с холероидным темпераментом, и, наоборот, снижения показателя КПУ у лиц с сангвиноидным типом темперамента. Разница показателей КПУ между холероидной и сангвиноидной группами весьма существенна: более, чем в два раза. При этом среднегрупповые показатели частоты сердечных сокращений практически одинаковы или имеют незначительные отличия.

Заключение

- Весьма перспективной с этой точки зрения является разработка экспресс-диагностики психоэмоционального статуса пациентов при назначении лечебных и профилактических стоматологических мероприятий, а также для решения весьма актуальной проблемы стоматофобии у наших пациентов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ