

*Белорусский государственный медицинский университет  
кафедра терапевтической стоматологии*

# **Диагностика и лечение гингивитов у детей и подростков**

*Доктор медицинских наук, профессор*

*Луцкая Ирина Константиновна,*

*Кандидат медицинских наук, доцент*

*Ермакова Ирина Дмитриевна*

*(ФГБОУ ВО ДОНГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)*

# ГИНГИВИТЫ

## ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ

Локализованный

Генерализованный

## ПО ТЕЧЕНИЮ

Лёгкий

Средний

Тяжёлый

## ПО ЭТИОЛОГИИ

Травматический

Инфекционный

Симптоматический

# ОСТРЫЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ ГИНГИВИТ

- Чаще всего ограничивается межзубным сосочком
- Причина - местная травма инородным предметом (зубочистка, игрушка и пр.), результат врачебного вмешательства




*На первый план выступает выраженный болевым симптом  
Объективно: признаки воспаления - отёк, гиперемия, кровоточивость  
Может присоединиться вторичная инфекция*


## ХРОНИЧЕСКИЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ ГИНГИВИТ

Связан с длительным слабым раздражителем в полости рта : скученность зубов, затрудненное прорезывание, наличие кариозных полостей

- *Может быть не выражен болевой симптом*
- *Механические, химические, температурные раздражители приведут к болезненности и кровоточивости*
- *Наличие инфицированного налёта на зубах создаёт микробный фактор*



# ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ГИНГИВИТ ПРИ ПЛОХОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА



## СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ



**Гиперпластический гингивит у подростков. Влияние гормонального фона**



**действующие вещества:**  
**метронидазола бензоат,**  
**хлоргексидина диглюконат**

**Взрослым и детям старше 6 лет при воспалении десен (гингивит) гель (капля размером с горошину) наносится на область десен 2 раза в день тонким слоем пальцем или ватной палочкой**

**Длительность курса лечения составляет в среднем 7–10 дней**

**Количество процедур зависит от тяжести заболевания**

**Комбинированный противомикробный препарат для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта**



**действующие вещества:**  
**метронидазола бензоат,**  
**хлоргексидина биглюконат**



**Хлоргексидин, Натрия борат, Натрия цитрат, Диметикон Гелеобразный раствор**



**Полоскания полости рта перед чисткой зубов в течение 30 секунд**



**Миритин (мирамистин)**



**Стоматология: лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонтитов, периодонтитов. Гигиеническая обработка съёмных протезов.**

Белорусско-голландское  
совместное предприятие ООО  
«Фармлэнд»

## Хлорофиллипт (густой экстракт листьев эвкалипта шаровидного)



Водные и спиртовые извлечения из листьев эвкалипта проявляют бактерицидный, противовирусный, фунгицидный, противопротозойный и противовоспалительный эффекты



Полоскания полости рта разведенным 1% спиртовым раствором (1 ст. л. на 1 л)

**Противопоказано** применение раствора, содержащего этиловый спирт, у детей и подростков в возрасте **до 18 лет**

## Фитопрепарат с противовоспалительным и противомикробным действием



**Жидкий экстракт ромашки аптечной, Гвайазулен, на спиртовой основе**

Применяют для полосканий в разведенном виде - 1/2 столовой ложки на 1 л воды.

**Различные виды таблеток для рассасывания, содержат растительные добавки, аскорбиновую кислоту и левом**



Взрослым и детям, по 1 таблетке через каждые 2-3 часа, до 8 таблеток в день

**Антисептик для местного применения в Лор-практике и стоматологии**

Детям в возрасте 3-7 лет - по 1 таб. 3 раза в сутки, детям в возрасте 7-12 лет - по 1 таб. 4 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 таб. 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 8 дней

**лизоцима гидрохлорид  
пиридоксина  
гидрохлорид**



**Пастилки для рассасывания**

**хлоргексидина гидрохлорид,  
бензокаин, эноксолон**

Для взрослых и детей старше 12 лет:  
1 пастилка с интервалом 2-3 ч  
(максимальная суточная доза — 8 пастилок)



## ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА

*Комбинированный препарат для местного применения*

Гель стоматологический **Холисал®** применяют по показаниям:



- ❖ стоматиты различной этиологии
- ❖ гингивиты
- ❖ повреждения слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов
- ❖ травмы слизистой оболочки полости рта
- ❖ боль при прорезывании зубов у детей
- ❖ хейлиты
- ❖ кандидоз слизистой оболочки полости рта
- ❖ небольшие оперативные вмешательства в полости рта

**Действие препарата направлено на этиологический фактор,  
патогенез и симптомы воспаления десны**



- Противовоспалительное
- Антимикробное
- Обезболивающее

**Холисал®** применяют *местно* 2-3 раза в день до еды (с целью обезболивания) или после еды и перед сном

**Для детей до 12 лет** полоску геля длиной **0,5 см**, для **взрослых** полоску геля длиной **1 см** выдавливают на чистый палец и втирают легкими массирующими движениями в пораженный участок слизистой оболочки полости рта

**С осторожностью используется у детей до 1 года !**

**Благодарим за  
внимание**

**Желаем  
успеха!**

