

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени
М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Принято решением Ученого совета
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
От «24» марта 2026г. Протокол № 3

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.08.51 ФТИЗИАТРИЯ
(2026 год приема)**

Донецк 2026

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вступительное испытание проводится в форме **компьютерного тестирования** (далее - тестирование).

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого поступающего автоматически.

Общее количество тестовых заданий составляет - **80 штук**, время отводимое поступающему на их решение – **60 минут**.

Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.

Результат тестирования в баллах (**1 балл равен 1 проценту**) отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет **70 баллов**

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ

Не позднее трех рабочих дней со дня завершения тестирования Университет формирует по каждому конкурсу списки поступающих. В списки поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам тестирования, и лица, отозвавшие документы, необходимые для поступления.

Списки поступающих ранжируются по следующим основаниям:

- **по убыванию суммы конкурсных баллов** (суммы экзаменационных баллов и баллов за индивидуальные достижения);
- при равенстве суммы конкурсных баллов – **по убыванию суммы экзаменационных баллов**, начисленных по результатам вступительного тестирования;
- при равенстве суммы экзаменационных баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, – **по убыванию балла за первичную аккредитацию специалиста**.

ОБРАЗЦЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Наиболее информативной уточняющей методикой при подозрении на деструкцию легочной ткани является
 - А. Обзорная рентгенография ОГК
 - Б. УЗИ легких
 - В. СКТ
 - Г. Рентгенография по Флейшнеру
2. Для проведения профилактического осмотра используют флюорографию с (в годах)
 - А. 15
 - Б. 18
 - В. 20
 - Г. 25
3. Основное место в лечении больного с впервые выявленным туберкулезом принадлежит
 - А. Этиотропной терапии
 - Б. Патогенетической терапии
 - В. Коллапсотерапевтическому лечению
 - Г. Хирургическому лечению
4. Противотуберкулезным препаратом, ухудшающим зрение, является
 - А. Этамбутол
 - Б. Изониазид
 - В. Рифампицин
 - Г. Бедаквилин

5. Витамин, который нужно назначить для профилактики побочного действия изониазида
- А. В6
 - Б. А
 - В. Е
 - Г. С
6. Больному туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью и хронической болезнью почек противопоказан
- А. Амикацин
 - Б. Клофазимин
 - В. Этионамид
 - Г. Циклосерин
7. Способом введения вакцины БЦЖ является
- А. Пероральный
 - Б. Внутримышечный
 - В. Внутрикожный
 - Г. Подкожный
8. Верифицировать диагноз туберкулеза легких позволяет
- А. Биопсия легких
 - Б. Компьютерная томография ОГК
 - В. Бронхоскопия
 - Г. Торакоскопия
9. Экстренная помощь при напряженном пневмотораксе включает
- А. Пункцию полости плевры с аспирацией воздуха
 - Б. Применение кардиотонических средств
 - В. Искусственную вентиляцию легких
 - Г. Внутривенное введение адреномиметиков
10. При подозрении на туберкулез у больного обязательным обследованием является исследование мокроты на
- А. КУБ
 - Б. вторичную флору
 - В. аспергиллы
 - Г. атипичные клетки
11. У ребенка выявлена гиперергическая реакция на пробу Манту с 2 ТЕ, которая проявляется наличием
- А. Инфильтрата 5 мм с везикулой
 - Б. Гиперемии диаметром 22 мм
 - В. Инфильтрата 15 мм
 - Г. Гиперемии диаметром 13 мм
12. К препаратам 2-го ряда относится
- А. Левофлоксацин
 - Б. Изониазид
 - В. Пиразинамид
 - Г. Рифампицин
13. К препаратам 1-го ряда относится
- А. Левофлоксацин
 - Б. Изониазид
 - В. Бедаквилин
 - Г. Амикацин

14. Из схемы лечения больного туберкулезом с зарегистрированной кардиотоксической реакцией необходимо исключить
- А. Циклосерин
 - Б. Протионамид
 - В. Линезолид
 - Г. Бедаквилин
15. Клинической формой туберкулеза, которая относится к остро прогрессирующим и часто приводит к гибели пациента, является
- А. Инфильтративный туберкулез
 - Б. Казеозная пневмония
 - В. Очаговый туберкулез
 - Г. Туберкулома
16. Химиопрофилактика туберкулеза проводится
- А. Всем новорожденным
 - Б. Лицам, находящимся в контакте с бактериовыделителем
 - В. Медицинским работникам
 - Г. Лицам, работающим с детьми дошкольного возраста
17. Заключительная дезинфекция проводится в
- А. Очаге туберкулеза до госпитализации больного
 - Б. Палате противотуберкулезного учреждения
 - В. Очаге туберкулеза после госпитализации больного
 - Г. Квартире, где проживает больной с бактериовыделением
18. Исследование, в котором нуждается больной с жалобами на нестерпимую головную боль, светобоязнь, рвоту, не приносящую облегчения
- А. Анализ мокроты на КУБ
 - Б. Фибробронхоскопия
 - В. Люмбальная пункция
 - Г. Рентгенография черепа
19. Больного туберкулезом с устойчивостью возбудителя к препаратам первого ряда необходимо лечить по режиму лечения ____ туберкулеза
- А. МЛУ
 - Б. преШЛУ
 - В. ШЛУ
 - Г. Чувствительного
20. Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л считается положительной при наличии ____ мм и более
- А. Инфильтрата (папулы) 5
 - Б. Гиперемии диаметром 10
 - В. Гиперемии диаметром 17
 - Г. Инфильтрата (папулы) 3
21. Противотуберкулезный препарат 2 ряда, который используется в лечении пациентов с изониазид-устойчивым туберкулезом
- А. Циклосерин
 - Б. Левофлоксацин
 - В. Бедаквилин
 - Г. Линезолид
22. Характерной жалобой при остром диссеминированном туберкулезе является
- А. Одышка

- Б. Кровохарканье
 - В. Боль в грудной клетке
 - Г. Боль в горле при глотании
23. Температура у больного туберкулезом повышается
- А. на протяжении всего дня
 - Б. в обеденное время
 - В. в утренние часы
 - Г. в вечерние часы
24. Жалобы больного на выраженную общую слабость, потливость, повышение температуры тела до 37,5С свидетельствуют о (об) ____ синдроме
- А. Диспептическом
 - Б. Бронхо-легочном
 - В. Интоксикационном
 - Г. Общемозговом
25. Сомнительная реакция на пробу Манту проявляется наличием
- А. Гиперемии любых размеров
 - Б. Везикулы любых размеров
 - В. Папулы 5 мм и больше
 - Г. Уколочной реакции
26. Особенностью туберкулеза у детей раннего возраста является
- А. Наличие контакта с больным туберкулезом взрослым
 - Б. Интактность лимфатической системы
 - В. Наличие выраженной клиники
 - Г. Быстрое течение процесса
27. У больных очаговым туберкулезом легких при осмотре обычно отмечают
- А. Дистрофические изменения кожи
 - Б. Расширенные межреберные промежутки
 - В. Дефицит массы тела
 - Г. Отсутствие видимых патологических изменений
28. Наименее чувствительным методом обнаружения возбудителя туберкулеза в патологическом материале является
- А. Световая микроскопия
 - Б. Посев на жидкую питательную среду
 - В. Посев на твердую питательную среду
 - Г. Молекулярно-генетический (GeneXpert)
29. Результат микроскопического исследования 1+ означает, что обнаружено
- А. 10-99 КУМ на 100 полей зрения
 - Б. 1-10 КУМ на 1 поле зрения
 - В. Более 10 КУМ в 1 поле зрения
 - Г. 1-9 КУМ на 100 полей зрения
30. Результат микроскопического исследования 3+ означает, что обнаружено
- А. 10-99 КУМ на 100 полей зрения
 - Б. 1-10 КУМ на 1 поле зрения
 - В. Более 10 КУМ в 1 поле зрения
 - Г. 1-9 КУМ на 100 полей зрения