Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Григорий Анатольевич

Должность: Ректор

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата подписания: 25.03.2025 12:06:02 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ Уникальный программный ключ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ с255аа436а6dccbd528274f1495fe530PATEЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии

«Утверждено» На заседании кафедры «30» августа 2024 г. протокол № 1 заведующий кафедрой д. мед. н., проф. Э.А.Майлян

Фонд оценочных средств по дисциплине

МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ

Специальность

31.05.02 Педиатрия

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Дата и номер протокола утверждения*	Раздел ФОС	Основание актуализации	Должность, ФИО, подпись, ответственного за актуализацию

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

микробиология, вирусология

Код и наименование	Код контролируемого индикатора достижения	Задания			
компетенции	компетенции	Тестовые задания	Ситуационные задания		
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)					
ОПК 4 Способен	ОПК-4.1.2. Знает методы и алгоритмы клинического,	Т1 ОПК 4.1.2	С1 ОПК 4.1.2		
применять	лабораторного и инструментального обследования	Т2 ОПК 4.1.2			
медицинские изделия,	пациентов с различными инфекционными и				
предусмотренные	неинфекционными заболеваниями, принципы постановки				
порядком оказания	клинического диагноза;				
медицинской помощи, а					
также проводить					
обследования пациента					
с целью установления					
диагноза					
	ОПК-4.1.4. Знает клиническую картину болезней и	Т3ОПК 4.1.4	С2ОПК 4.1.4		
	состояний, требующих направления детей на	Т4 ОПК 4.1.4			
	лабораторное и инструментальное обследование, с учетом				
	действующих клинических рекомендаций (протоколами				
	лечения), порядками оказания медицинской помощи и с				
	учетом стандартов медицинской помощи;				
	ОПК-4.2.4. Умеет интерпретировать результаты сбора	Т5 ОПК 4.2.4	С3 ОПК 4.2.4		
	жалоб и анамнеза, лабораторного и инструментального	Т6 ОПК 4.2.4			
	обследования, формулировать предварительный диагноз;				
	ОПК-4.3.3. Владеет интерпретация данных клинических и	Т7 ОПК-4.3.3.	С4 ОПК-4.3.3.		
	дополнительных исследования детей по возрастно-	Т8 ОПК-4.3.3.			
	половым группам;				
ОПК-5. Способен	ОПК-5.1.11. Знает структурные и функциональные	Т9 ОПК-5.1.11.	С5 ОПК-5.1.11.		
оценивать	основы болезней и патологических процессов, причины,	Т10 ОПК-5.1.11.			
морфофункциональные,	основные механизмы развития и исходов типовых				
физиологические	патологических процессов, нарушений функции органов и				
состояния и систем;					

патологические			
процессы в организме			
человека для решения			
профессиональных			
задач			
	ОПК-5.1.15. Знает основные лабораторные симптомы и	Т11 ОПК-5.1.15	С6 ОПК-5.1.15
	синдромы при заболеваниях внутренних органов и	Т12 ОПК-5.1.15	
	механизмы их возникновения;		
	ОПК-5.2.5. Умеет интерпретировать результаты	Т13 ОПК-5.2.5.	С7 ОПК-5.2.5.
	лабораторного обследования по возрастно-половым	Т14 ОПК-5.2.5.	
	группам;		
	ОПК-5.3.4. Владеет интерпретированием результатов	Т15 ОПК-5.3.4.	С8 ОПК-5.3.4
	лабораторного и инструментального обследования	Т16 ОПК-5.3.4.	
	пациентов по возрастно-половым группам;		

Оценивание результатов текущей успеваемости, ИМК, экзамена и выставление оценок за дисциплину проводится в соответствии с действующим Положением об оценивании учебной деятельности студентов ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Образцы оценочных средств

Тестовые задания

- **Т1 ОПК-4.1.2.** ГЕРОИЧЕСКИЙ ОПЫТ САМОЗАРАЖЕНИЯ КРОВЬЮ БОЛЬНЫХ СЫПНЫМ ТИФОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЫЛ ПРОВЕДЕН
 - А. Г.Н. Минхом
 - Б. Н.Ф. Гамалея
 - В. *О.О. Мочутковским
 - Г. Д.И. Ивановским
- **Т2 ОПК-4.1.2.** В МАЗКЕ СЛИЗИ ИЗ МИНДАЛИН БОЛЬНОГО РЕБЕНКА АНГИНОЙ НАЙДЕНЫ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ШАРОВИДНОЙ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ КОРОТКИМИ ЦЕПОЧКАМИ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
 - А. * Стрептококков
 - Б. Стафилококков
 - В. Диплококков
 - Г. Микрококков
- ТЗ ОПК-4.1.4 У БОЛЬНОГО РЕБЕНКА, С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ДИФТЕРИЮ ПРИ МИКРОСКОПИИ ОТДЕЛЯЕМОГО ПОРАЖЕННОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕВА ОБНАРУЖЕНЫ ЖЕЛТЫЕ ПАЛОЧКИ С ТЕМНО-СИНИМИ УТОЛЩЕНИЯМИ НА КОНЦАХ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИЕ
 - А. *Зерен волютина
 - Б. Плазмид
 - В. Капсул
 - Г. Спор
- **Т4 ОПК-4.1.4** ПРИ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ МОКРОТЫ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПРИМЕНЯЮТ МЕТОД ОКРАСКИ
 - А. *Циль-Нильсена
 - Б. Бурри-Гинса
 - В. Романовского
 - Г. Грама
- **Т5 ОПК-4.2.4.** В ПОСЕВЕ ГНОЯ ИЗ ФУРУНКУЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ ШАРОВИДНОЙ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ КАК ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
 - А. * Стафилококков
 - Б. Диплококков
 - В. Микрококков
 - Г. Стрептококков
- **Т6 ОПК-4.2.4.** В ОКРАШЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ВЫ УВИДЕЛИ ШАРОВИДНЫЕ ФИОЛЕТОВЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЦЕПОЧКОЙ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ В МАЗКЕ
 - А. Микрококков
 - Б. Диплококков
 - В. *Стрептококков

Г. Вибрионов
Т7 ОПК-4.3.3. ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККОВ ИЗ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЮТ АГАР
А. Глюкозо-кровяной Б. *Желточно-солевой В. Висмут-сульфитный Г. Кровяной теллуритовый
Т8 ОПК-4.3.3. ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ КЛЕТКИ С НЕОКРАШЕННОЙ КАЙМОЙ ВОКРУГ ОКРАШЕННЫХ БАКТЕРИЙ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИ МИКРОСКОПИИ МАЗКА ИЗ ОРГАНОВ ПОГИБШЕЙ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МЫШИ А. Включение Б. Спора В. * Капсула Г. Клеточная стенка
Т9 ОПК-5.1.11. ПЕРИОД МЕЖДУ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗМ И ПЕРВЫМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А. Острым Б. Реконвалесцентным В. Продромальным Г. *Инкубационным
Т10 ОПК-5.1.11. В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НОВОРОЖДЕННОГО НАЙДЕНЫ АНТИТЕЛА К ВИРУСУ КОРИ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ ИММУНИТЕТА А. *Естественного пассивного Б. Естественного активного В. Искусственного пассивного Г. Искусственного активного
Т11 ОПК-5.1.15. В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАЦИИ БАКТЕРИЯМИ БЕЛКОВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ СЕРОВОДОРОД, ИЗМЕНЯЯ ЦВЕТ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАЖКИ, ПРОПИТАННОЙ РАСТВОРОМ УКСУСНОКИСЛОГО СВИНЦА НА А. * Черный Б. Розовый

- **Т12 ОПК-5.1.15.** ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ______СВОЙСТВ, ВЫДЕЛЕННУЮ ЧИСТУЮ КУЛЬТУРУ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОСЕЯЛИ В СРЕДЫ ГИССА (ПЁСТРЫЙ РЯД) И В ПРОБИРКУ С МПБ, КУДА ПОМЕСТИЛИ ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАЖКИ НА ИНДОЛ И СЕРОВОДОРОД
 - А. *Биохимических
 - Б. Культуральных

В. Красный Г. Коричневый

- В. Сахаролитических
- Г. Протеолитических

- Т13 ОПК-5.2.5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ БРЮШНОГО ТИФА СТАВЯТ РЕАКЦИЮ______, ПРИ КОТОРОЙ К РАЗНЫМ РАЗВЕДЕНИЯМ СЫВОРОТКИ БОЛЬНОГО ДОБАВЛЯЮТ ДИАГНОСТИКУМЫ ТРЕХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ И РЕЗУЛЬТАТ КОТОРОЙ ОЦЕНИВАЮТ ПО НАЛИЧИЮ ХЛОПЬЕВ ИЗ СКЛЕЕННЫХ БАКТЕРИЙ
 - А. *Видаля
 - В. Борде-Жангу
 - С. Вассермана
 - D. Райта
- **Т14 ОПК-5.2.5.** С ПОМОЩЬЮ РИФ ПРИ МИКРОСКОПИИ ПРЕПАРАТА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ СЛИЗИСТО-ГНОЙНОГО КОМОЧКА КАЛА, ОБНАРУЖЕНО СВЕЧЕНИЕ ПО ПЕРИФЕРИИ БАКТЕРИЙ
 - А. *Изумрудно-зеленое
 - Б. Черное
 - В. Красное
 - Г. Желтое
- **Т15 ОПК-5.3.4.** ПРИ ВВЕДЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕБЕНКУ ДОНОРСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА БЫЛ СОЗДАН
 - А. *Пассивный искусственный иммунитет
 - Б. Естественный пассивный иммунитет
 - В. Антитоксический искусственный иммунитет
 - Г. Поствакцинальный активный иммунитет
- **Т16 ОПК-5.3.4.** ПРИ МИКРОСКОПИИ МАЗКА, ОКРАШЕННОГО ПО ГРАМУ, В ПРЕПАРАТЕ ОБНАРУЖЕНА МАССА ЛЕЙКОЦИТОВ, В ЦИТОПЛАЗМЕ КОТОРЫХ НАХОДИЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БОБОВИДНОЙ ФОРМЫ ДИПЛОКОККОВ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ
 - А. *Фагоцитозу
 - Б. Метаболизму
 - В. Капсулообразованию
 - Г. Спорообразованию

Во всех тестовых заданиях правильный ответ отмечен звездочкой (*)

Ситуационные задания

С1 ОПК-4.1.2. Изучая формы бактерий, Вы для микроскопии окрашенных мазков воспользовались иммерсионной системой светового микроскопа.

Вопросы:

- 1. По каким признакам можно определить иммерсионный объектив микроскопа?
- 2. Почему при изучении морфологии бактерий необходимо пользоваться иммерсионной системой микроскопа?
- 3. Какие правила необходимо соблюдать при изучении препаратов с помощью иммерсионной системы микроскопа?

- 1. Иммерсионные объективы у нижнего края ободок: белый водная иммерсия, черный масляная иммерсия. У объективов «сухих» систем ободка нет.
- 2. При микроскопии с использованием иммерсионного объектива его погружают в масло (кедровое, персиковое и др.), показатель преломления которого близок к показателю преломления стекла. В этом случае пучок света, вышедший за пределы предметного стекла,

не рассеивается, и лучи, не меняя своего направления, попадают в объектив. Картина строения объекта становится тем более достоверной, чем больше отклоненных лучей попадали в объектив микроскопа. Кроме того, иммерсионный объектив имеет более высокую разрешающую способность.

3.

- центрировать иммерсионный объектив;
- нанести каплю масла на препарат и укрепить препарат на предметном столике;
 - установить препарат на предметный столик;
- опустить объектив до погружения фронтальной линзы иммерсионного объектива в масло
 - осветить поле зрения плоским зеркалом;
- найти изображение вращением манометрического винта (на себя), глядя в окуляр микроскопа;
- установить четкость изображения вращением микрометрического ввита на пол-оборота в одну и другую сторону
- **C2 ОПК-4.1.4.** В окрашенных мазках из исследуемого материала (гной) Вы обнаружили шаровидной формы микроорганизмы, располагающиеся в виде неправильных скоплений.

Вопросы:

- 1. Как называются микроорганизмы, имеющие такую морфологию?
- 2. С чем связано такое расположение кокков?
- 3. Каким способом окрашен мазок?

Эталоны ответов:

- 1. Стафилококки.
- 2. Гроздевидное расположение связано с тем, что плоскости деления проходят в разных направлениях.
 - 3. Простым.
- **C3** ОПК-4.2.1. В материале (рвотные массы), поступившем в баклабораторию, больного ребенка с подозрением на холеру были обнаружены грамотрицательные, слегка изогнутые палочки, и было проведено изучение подвижности бактерий.

Вопросы:

- 1. С какой целью проводится изучение подвижности микроорганизмов?
- 2. Как был приготовлен препарат для определения подвижности бактерий, содержащихся в исследуемом материале?
- 3. При использовании какой системы светового микроскопа изучается подвижность микроорганизмов?

- 1. В практических лабораториях изучение микроорганизмов в живом состоянии используют для определения их подвижности, которая является одним из признаков видовой принадлежности микроорганизмов.
- 2. Препарат готовится методом раздавленной или висячей капли. Более четкие результаты получают при микроскопии в темном поле или фазово-контрастной микроскопии.
- 3. Микроскопию можно проводить, используя объектив с увеличением 40 сухой системы светового микроскопа.

C4 ОПК-4.2.2. У ребенка 7 лет поставлен диагноз «Ангина». Врач с целью дифференциальной диагностики двумя тампонами взял материал из зева и направил в баклабораторию. На среде Леффлера появился рост, напоминающий шагреневую кожу.

Вопросы:

- 1. Какие микроорганизмы могут дать такой рост?
- 2. Как будете окрашивать мазки из культуры, выросшей в виде шагреневой кожи?
- 3. На какие характерные морфологические признаки необходимо обратить внимание при микроскопии окрашенного мазка?

Эталоны ответов:

- 1. Возбудители дифтерии
- 2. По методам Грама, Леффлера и Нейссера
- 3. Грамположительные палочки и наличие волютиновой зернистости. Дифтерийные бактерии располагаются в виде скоплений, напоминающих войлок, или горсть булавок, брошенных на стол. Отдельные пары дифтерийных бактерий располагаются под углом в виде римской цифры V.
- C5 ОПК-5.1.11. У больного с подозрением на крупозную пневмонию в бактериологической лаборатории при изучении окрашенных мазков обнаружены грамположительные диплококки, слегка вытянутые, со слегка заострёнными противоположными концами, окружённые нежной капсулой.

Вопросы:

- 1. Какие микроорганизмы обнаружены при микроскопии? (Укажите русское и латинское название рода и вида).
 - 2. Из какого материала могли быть приготовлены мазки от этого больного?
- 3. Опишите культуральные особенности колоний изучаемого возбудителя, выросших на 5% кровяном агаре.

Эталоны ответов:

- 1. Пневмококки (Streptococcus pneumoniae).
- 2. Из мокроты, при тяжёлой форме из крови.
- 3. Мелкие или точечные колонии, серого цвета, полупрозрачные, блестящие, чаще S-формы, на кровяном агаре вокруг колоний видна зона зеленоватого гемолиза (α-гемолиз).
- **С6 ОПК-5.1.15.** В вирусологической лаборатории при заражении куриных эмбрионов носоглоточными смывами, взятыми у больного ребенка с клинической картиной ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), выделены вирусы, которые вызывали агглютинацию 1 % взвеси куриных эритроцитов.

Вопросы

- 1. Какие типы вирусов могли быть выделены?
- 2. По свойствам какого антигена выделенные вирусы разделены на типы?
- 3. На основании различий каких антигенов один из типов выделенных вирусов разделен на ряд подтипов?

- 1. Вирусы гриппа типа А, В, С
- 2. По свойствам S антигена вирусы гриппа подразделяют в РСК на три типа: A, B, C

- 3. На основании различий антигенов гемагглютинина и нейраминидазы вирус типа A разделен на ряд подтипов (H1N1, H2N1, H3N2).
- **С7 ОПК-5.2.5.** В детском саду после употребления в пищу творога у детей возникли заболевания, характеризующиеся острым началом, болями, тошнотой, рвотой, поносом. При бактериоскопии мазков из творога и рвотных масс, окрашенных по Граму, обнаружены грамположительны кокки.

Вопросы:

- 1. Ваш предполагаемый диагноз?
- 2. Какой материал будете брать для исследования?
- 3. Какие микробиологические исследования необходимо провести для подтверждения диагноза?

Эталоны ответов:

- 1. Пищевая токсикоинфекция.
- 2. Творог, рвотные массы, промывные воды желудка, испражнения
- 3. Бактериологический метод исследования
- **С8 ОПК-5.3.4.** При посеве испражнений переболевшего брюшным тифом на среду Эндо и последующей инкубации в термостате получили рост колоний, имеющих различную окраску и размеры. Одни колонии были красного цвета, крупные; другие бесцветные, мелкие.

Вопросы:

- 1. Одного ли вида микроорганизмы находились в исследуемом материале?
- 2. К какой группе сред (по назначению) относится указанная выше среда?
- 3. Назовите еще ряд питательных сред, применяемых для этих целей.

- 1. Учитывая, что на среде появились колонии, различные как по цвету, так и по размерам, можно прийти к заключению, что в испражнениях были два различных вида микробов.
 - 2. К дифференциально-диагностическим средам.
 - 3. Плоскирева, Левина, висмут-сульфит агар, среды Гисса.