



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13.11 2017

Донецк

№ 2036

Об утверждении Календаря
обязательных профилактических
прививок Донецкой Народной
Республики

С целью обеспечения эпидемического благополучия населения Донецкой Народной Республики, во исполнение ст. 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», руководствуясь пунктами 1, 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №1-33 от 10.01.2015,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Календарь обязательных профилактических прививок Донецкой Народной Республики, прилагается.
2. Руководителям учреждений/органов здравоохранения Донецкой Народной Республики:
 - 2.1. обеспечить ознакомление сотрудников подведомственных учреждений здравоохранения с настоящим Приказом;
 - 2.2. обеспечить организацию выполнения обязательных профилактических прививок населению в соответствии с Календарем обязательных профилактических прививок Донецкой Народной Республики, утвержденного настоящим Приказом.
3. Персональная ответственность за выполнение настоящего Приказа возлагается на руководителей учреждений здравоохранения.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.А. Оприщенко

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики

13.11.2017 № 2036

Календарь обязательных профилактических прививок Донецкой Народной Республики

Возраст	Прививки против								
1 день		Гепатита В** (для групп риска)							
3-5 день	Туберкулеза*								
1 мес.		Гепатита В** (для групп риска)							
2 мес		Гепатита В** (для групп риска)				Пневмококковой инфекции*****			
3 мес			Гепатита В***	Коклюша, дифтерии, столбняка	Полиоислита ****		Гемофильной инфекции*****		
4,5 мес			Гепатит В***	Коклюша, дифтерии, столбняка	Полиоислита ****	Пневмококковой инфекции*****	Гемофильной инфекции*****		
6 мес				Коклюша, дифтерии, столбняка	Полиоислита ****		Гемофильной инфекции*****		
9 мес			Гепатит В***						

12 мес		Гепатита В** (для групп риска)						Кори. эпидемического паротита. краснухи
15 мес						Пневмококковая инфекция ***** (ревакцинация)		
18 мес				Коклюша. дифтерии. столбняка (ревакцинация)	Полиомиелита **** (ревакцинация)		Гемофильной инфекции (ревакцинация) *****	
6 лет				Дифтерии. столбняка (ревакцинация)	Полиомиелита (ревакцинация) ****			Кори. эпидемического паротита, краснухи (ревакцинация)
7 лет	Туберкулеза*							
14 лет				Дифтерии. столбняка (ревакцинация)	Полиомиелита (ревакцинация) ****			
24 лет				Дифтерии. столбняка (далее каждые 10 лет)				

* - вакцинация против туберкулеза после 2 месяцев и ревакцинация против туберкулеза в 7 лет проводится по результатам обязательной предварительной пробы Манту с 2 ТЕ детям с отрицательным результатом пробы и при отсутствии информации о ранее установленном факте тубинфицирования.

** - схема **обязательной** вакцинации против гепатита В для **групп риска** (детям, родившимся от матерей носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В во время беременности, не имеющих результаты обследований на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами; детям от ВИЧ-инфицированных родителей; детям, которым планируется хирургическое лечение, переливание крови, гемодиализ) По желанию родителей (законных представителей) вакцинация против гепатита В может проводиться с

рождения детям, не относящимся к группе риска, по схеме 0-1-6 (1 доза – в момент начала вакцинации, 2 доза- через 1 месяц после 1 прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала вакцинации).

***** - обязательная** вакцинация против гепатита В для **остального населения**, проводится по достижению **3-х месячного возраста** моновакциной против гепатита В по схеме: 0-1-6 (1 доза – в момент начала вакцинации, 2 доза- через 1 месяц после 1 прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала вакцинации) Возможна вакцинация против гепатита В трехкратно комплексными вакцинами с соблюдением интервалов согласно инструкции по применению иммунобиологического препарата. При вакцинации детей с 3х месяцев моновакциной против гепатита В совместно с АКДС-вакциной, введение второй дозы моновакцины против гепатита В возможно совместно с АКДС вакциной через 1,5 месяца, 3 дозу моновакцины против гепатита В необходимо ввести через 6 месяцев после первой вакцинации против гепатита В.

******-** первая и вторая вакцинация для профилактики полиомиелита проводятся инактивированной вакциной

********* - вакцинация против пневмококковой инфекции **является обязательной** для детей и взрослых, которые **относятся к группам риска** (недоношенным, детям рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией; лицам с ВИЧ-инфекцией, функциональной или анатомической асплинией (в том числе серповидно-клеточной анемией), поражениями почек (хроническая почечная недостаточность или нефротический синдром), с иммунодефицитными состояниями, с бронхиальной астмой, с хроническими заболеваниями печени, легких, сердца; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; часто болеющим и **по желанию**.

Рекомендована иммунизация также лицам в возрасте ≥ 65 лет, призывникам, лицам, находящимся в специальных социальных учреждениях (домах ребенка и др).

Если вакцинация против пневмококковой инфекции не проведена в первые 6 месяцев жизни ребенка, проводится вакцинация двукратно с интервалом в 2 месяца до 2 лет конъюгированной вакциной. После 2 лет до 6 лет проводится вакцинация против пневмококковой инфекции двукратно с интервалом 2 месяца (первая доза конъюгированной вакциной, вторая доза – полисахаридной вакциной). Старше 6 лет вакцинация проводится однократно полисахаридной вакциной с ревакцинацией полисахаридной вакциной через 5 лет.

*******-** вакцинация против гемофильной инфекции **является обязательной** для детей, **относящихся к группам риска** (с иммунодефицитными состояниями и анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающих иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от родителей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в домах ребенка, детям на искусственном вскармливании; часто болеющим детям; недоношенным детям) и **по желанию**. Если ребенок прививается от гемофильной инфекции после 6 месяцев, вводят вакцину двукратно с интервалом в 1 месяц с ревакцинацией в 18 месяцев. От 1 до 5 лет вакцинация против гемофильной инфекции проводится однократно

Начальник отдела оказания
медицинской помощи детскому населению