

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертационной работы Аль-Давуда Амджада
«ПЕРВИЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И
СФИНКТЕРСОХРАНЯЮЩИЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО
ПОВОДУ РАКА У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 –онкология**

Хирургическое лечение рака прямой кишки у больных старческого возраста на сегодняшний день по-прежнему остается единственным способом, позволяющим надеяться на радикальное излечение. В этом аспекте в современной онкологии существует ряд проблем, прежде всего связанных с частым отказом от оперативного лечения данному контингенту пациентов. Основным аргументом, по мнению исследователей, является высокий риск развития послеоперационных осложнений и летальности, что обусловлено выраженной, нередко декомпенсированной сопутствующей патологией, частым осложненным течением опухолевого заболевания. Результатом такого мнения является частый отказ не только от радикального оперативного лечения, но и от химиолучевой терапии. В тех случаях, когда оперативное лечение все же применяется, широко используются обструктивные способы операций, о выполнении первично-восстановительных резекций речь практически не идет.

Изыскание возможности соискателем применения первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций не вызывают сомнений в актуальности данной работы.

В автореферате диссертации Аль-Давуда Амджада широко раскрыта тема использования в хирургическом лечении больных раком прямой кишки разработанных в клинике РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих способов операций, в частности, использование дубликатурного анастомоза, а также различных видов сфинктерсохраняющих операций с низведением трансплантата на промежность. Стоит отметить крайне низкую частоту несостоятельности швов колоректального анастомоза, которая составила менее 1%. Использование дубликатурного анастомоза, проксимальной резекции толстой кишки с низведением и формированием толстокишечного резервуара, а также наданальная резекция прямой кишки являются достойной альтернативой аппаратного шва (анастомоза) в виду отсутствия формирования превентивной илео-, колостомы.

Разработаны простые уравнения регрессии в 95% ДИ, вычисления которых позволяет планировать количество койко-дней, затраченных пациентом в до- и послеоперационном периодах, что позволяет планировать определенные затраты лечебного учреждения.

Получены удовлетворительные результаты отдаленной выживаемости.
Структура и содержание автореферата и их оформление соответствуют требованиям ВАК.

По данным автореферата, диссертация Аль-Давуда Амджада на тему «Первично-восстановительные и сфинктерсохраняющие резекции прямой кишки по поводу рака у больных старческого возраста. Пути повышения эффективности лечения», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология, является законченной научно-исследовательской работой. По актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует требованиям, установленным п. 2.2 для соискания ученой степени кандидата медицинских наук Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13.


Заведующий проктологическим отделением
ГУ «ЛРКОД» ЛНР



Л. И. Цыганок

Подпись Л. И. Цыганок заверяю:

Старший инспектор отдела кадров
ГУ «ЛРКОД» ЛНР




Е. Ю. Слюсаренко

« 30 » марта 2021 г.