
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
Кафедра дерматовенерологии и косметологии



Соматотипологическая характеристика пациентов с аллергодерматозами по антропометрическим индексам

Научный руководитель:

Зав. каф., д. мед. н., проф. Проценко Т.В.

Докладчики:

Загоруйко В.В. – студентка 5 к., 10 гр., леч. № 1 ф-та

Ерёменко В.А. – ординатор 1-го года обучения по специальности дерматовенерология

14 октября 2026 г. Донецк

Актуальность

Антропометрический профиль пациентов с воспалительными заболеваниями кожи.

Обхват запястья характеризует конституциональный тип.

ИМТ и WHtR дополняют описание массы тела и соотношения талии к росту.

Совместный анализ учитывает пол, возраст и отдельные дерматологические диагнозы.



Цель исследования

Охарактеризовать конституциональные типы по обхвату запястья и антропометрические особенности пациентов с аллергодерматозами.

Общая группа, мужчины и женщины, отдельные заболевания и формы экземы.



Задачи исследования

01 Определить частоту конституциональных типов.

02 Описать измерения и расчётные индексы по полу.

03 Сопоставить типы по диагнозам и формам экземы.

04 Оценить ассоциации антропометрии с полом и возрастом.



Объект исследования

Поперечное описательно-аналитическое исследование.

28

Пациентов

18

Мужчин

10

Женщин

Возраст: 19–86 лет

Экзема, аллергический и атопический дерматит, крапивница.

Методы исследования

Измерение сантиметровой лентой и расчёт антропометрических индексов.



Обхват запястья и талии
Рост, масса тела, плечевой показатель



ИМТ = масса (кг) / рост² (м²)

WHtR = талия (см) / рост (см)

Анализ различий по полу, корреляций и линейных моделей.

Таблица 1. Критерии конституциональных типов по индексу Соловьёва

Половые границы по обхвату запястья, см.

Конституциональный тип	Мужчины обхват запястья, см	Женщины обхват запястья, см
Астенический	<18,0	<15,0
Нормостенический	18,0–20,0	15,0–17,0
Гиперстенический	>20,0	>17,0

Граничные значения входят в нормостенический интервал.

Таблица 2. Распределение пациентов по возрасту и полу

n (%). Доли внутри каждого столбца.

Возрастная группа	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
18–29 лет	5 (17,9%)	5 (27,8%)	0 (0,0%)
30–44 года	6 (21,4%)	5 (27,8%)	1 (10,0%)
45–59 лет	4 (14,3%)	3 (16,7%)	1 (10,0%)
60–74 года	5 (17,9%)	1 (5,6%)	4 (40,0%)
75 лет и старше	8 (28,6%)	4 (22,2%)	4 (40,0%)

Медиана возраста: мужчины 35,5 года, женщины 73,5 года.

Таблица 3. Распределение по дерматологическим диагнозам

n (%). Доли внутри соответствующей группы.

Диагноз	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
Экзема	**22 (78,6%)**	**14 (77,8%)**	**8 (80,0%)**
Аллергический дерматит	3 (10,7%)	1 (5,6%)	2 (20,0%)
Атопический дерматит	2 (7,1%)	2 (11,1%)	0 (0,0%)
Крапивница	1 (3,6%)	1 (5,6%)	0 (0,0%)

Экзема составляет 78,6% выборки (22 пациента).

Таблица 4. Основные антропометрические измерения в общей группе и по полу

M ± SD. Среднее значение ± стандартное отклонение.

Показатель	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
Рост, см	172,3 ± 9,1	177,4 ± 6,9	163,1 ± 3,2
Масса тела, кг	79,8 ± 14,5	80,3 ± 15,0	78,7 ± 14,3
Обхват запястья, см	17,9 ± 1,8	18,2 ± 1,9	17,4 ± 1,7
Обхват талии, см	96,7 ± 16,0	95,6 ± 15,2	98,7 ± 18,1
Плечевой показатель, см	38,6 ± 7,5	39,8 ± 7,7	36,6 ± 7,2

Средние значения описывают размеры тела в исходных единицах.

Таблица 5. Возраст и длительность заболевания в сочетании с антропометрическими индексами

Me [Q1; Q3]. Медиана [нижний квартиль; верхний квартиль].

Показатель	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
Возраст, лет	54,5 [33,2; 76,2]	35,5 [27,8; 68,5]	73,5 [69,8; 77,8]
Длительность заболевания, лет	1,0 [0,0; 1,0]	1,0 [0,0; 1,0]	1,0 [1,0; 2,8]
ИМТ, кг/м²	25,83 [22,64; 31,67]	24,43 [22,64; 28,11]	32,20 [25,31; 32,83]
WHtR	0,529 [0,479; 0,634]	0,527 [0,474; 0,567]	0,611 [0,515; 0,692]

Медиана ИМТ всей группы 25,83 кг/м², WHtR 0,529.

Таблица 6. Половые различия по количественным показателям

U-критерий Манна–Уитни. Поправка Бенджамини–Хохберга.

Показатель	U	δ Клиффа	p	p с поправкой
Возраст, лет	48,0	-0,467	0,0464	0,1746
Длительность заболевания, лет	61,0	-0,322	0,1424	0,3163
Рост, см	177,0	0,967	<0,0001	0,0003
Масса тела, кг	87,0	-0,033	0,9044	0,9044
Обхват запястья, см	112,5	0,250	0,2879	0,3702
Обхват талии, см	85,0	-0,056	0,8289	0,9044
Плечевой показатель, см	116,5	0,294	0,2108	0,3163
ИМТ, кг/м²	50,0	-0,444	0,0582	0,1746
WHtR	63,0	-0,300	0,2039	0,3163

Таблица 7. Конституциональные типы в общей группе у мужчин и женщин


n (%). 95% ДИ доли в общей группе по методу Уилсона.

Тип	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10	95% ДИ доли всей группы, %
Астенический	8 (28,6%)	8 (44,4%)	0 (0,0%)	15,3–47,1
Нормостенический	**14 (50,0%)**	**9 (50,0%)**	**5 (50,0%)**	**32,6–67,4**
Гиперстенический	6 (21,4%)	1 (5,6%)	5 (50,0%)	10,2–39,5

Нормостенический тип встречается у 50,0% пациентов.

Рисунок 1. Конституциональные типы по обхвату запястья в общей группе и по полу

Доли внутри общей группы и каждой половой подгруппы.



Распределение по полу: p = 0,0052, p с поправкой = 0,0103.

Таблица 8. Конституциональные типы по диагнозам в общей группе


n (%). Доли внутри каждого диагноза.

Диагноз	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Экзема	22	5 (22,7%)	13 (59,1%)	4 (18,2%)
Аллергический дерматит	3	0 (0,0%)	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Атопический дерматит	2	2 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Крапивница	1	1 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

При экземе преобладает нормостенический тип (59,1%).

Рисунок 2. Распределение конституциональных типов по отдельным аллергодерматозам

Доли внутри каждого диагноза.



Малые подгруппы (n = 1–3) имеют описательное значение.

Таблица 9. Конституциональные типы по диагнозам у мужчин

n (%). Доли внутри каждого диагноза у мужчин.

Диагноз	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Экзема	14	5 (35,7%)	8 (57,1%)	1 (7,1%)
Аллергический дерматит	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Атопический дерматит	2	2 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Крапивница	1	1 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

При экземе у мужчин нормостенический тип: 8 из 14 (57,1%).

Таблица 10. Конституциональные типы по диагнозам у женщин

n (%). Доли внутри каждого диагноза у женщин.

Диагноз	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Экзема	8	0 (0,0%)	5 (62,5%)	3 (37,5%)
Аллергический дерматит	2	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)
Атопический дерматит	0	0 (—)	0 (—)	0 (—)
Крапивница	0	0 (—)	0 (—)	0 (—)

При экземе у женщин нормостенический тип: 5 из 8 (62,5%).

Таблица 11. Конституциональные типы при формах экземы в общей группе

n (%). Доли внутри каждой формы экземы.

Форма экземы	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Микробная	**17**	**5 (29,4%)**	**9 (52,9%)**	**3 (17,6%)**
Нуммулярная	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Варикозная	1	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)
Себорейная	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Форма не уточнена	2	0 (0,0%)	2 (100,0%)	0 (0,0%)

Микробная экзема: 17 из 22 случаев (77,3%).

Таблица 12. Конституциональные типы при формах экземы у мужчин

n (%). Доли внутри каждой формы экземы у мужчин.

Форма экземы	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Микробная	**13**	**5 (38,5%)**	**7 (53,8%)**	**1 (7,7%)**
Нуммулярная	0	0 (—)	0 (—)	0 (—)
Варикозная	0	0 (—)	0 (—)	0 (—)
Себорейная	0	0 (—)	0 (—)	0 (—)
Форма не уточнена	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)

Микробная форма экземы у мужчин: 13 из 14 случаев.

Таблица 13. Конституциональные типы при формах экземы у женщин

n (%). Доли внутри каждой формы экземы у женщин.

Форма экземы	n	Астенический	Нормо-стенический	Гипер-стенический
Микробная	**4**	**0 (0,0%)**	**2 (50,0%)**	**2 (50,0%)**
Нуммулярная	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Варикозная	1	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)
Себорейная	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Форма не уточнена	1	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)

Микробная форма экземы у женщин: 4 из 8 случаев.

Таблица 14. Антропометрические индексы и обхват запястья по нозологиям

Me [Q1; Q3]. Отдельный анализ каждой нозологии.

Категория	n	Запястье, см	ИМТ, кг/м²	WHtR
Экзема	22	17,8 [17,0; 18,9]	25,83 [22,65; 30,13]	0,529 [0,496; 0,589]
Аллергический дерматит	3	19,5 [19,2; 19,8]	34,29 [32,93; 35,07]	0,671 [0,647; 0,727]
Атопический дерматит	2	17,2 [17,1; 17,4]	23,31 [22,98; 23,65]	0,464 [0,460; 0,468]
Крапивница	1	15,5	17,96	0,417

Me [Q1; Q3]. При n = 1 указано фактическое значение.

Таблица 15. Возраст и антропометрические индексы по конституциональным типам

Me [Q1; Q3]. Описательное сопоставление типов.

Тип	n	Возраст, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR
Астенический	8	28,5 [23,2; 43,8]	22,64 [21,05; 23,00]	0,470 [0,455; 0,515]
Нормостенический	14	53,0 [35,2; 76,5]	25,83 [23,73; 28,97]	0,551 [0,501; 0,616]
Гиперстенический	6	75,0 [73,2; 76,8]	33,36 [32,09; 35,47]	0,698 [0,561; 0,769]

Конституциональные типы различаются по возрастному составу.


Таблица 16. Распределение пациентов по категориям ИМТ

n (%). Доли внутри каждого столбца.

Категория ИМТ, кг/м²	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
Дефицит массы (<18,5)	1 (3,6%)	1 (5,6%)	0 (0,0%)
Нормальная масса (18,5–<25,0)	13 (46,4%)	10 (55,6%)	3 (30,0%)
Избыточная масса (25,0–<30,0)	5 (17,9%)	5 (27,8%)	0 (0,0%)
Ожирение I (30,0–<35,0)	7 (25,0%)	1 (5,6%)	6 (60,0%)
Ожирение II (35,0–<40,0)	1 (3,6%)	0 (0,0%)	1 (10,0%)
Ожирение III (≥40,0)	1 (3,6%)	1 (5,6%)	0 (0,0%)

Рисунок 3. Категории ИМТ в общей группе у мужчин и женщин

Доли внутри каждого столбца.



ИМТ ≥ 30 кг/м²: мужчины 11,1%, женщины 70,0%.

Таблица 17. Распределение пациентов по интервалам WHtR

n (%). WHtR = обхват талии / рост.

Интервал	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
WHtR <0,50	9 (32,1%)	7 (38,9%)	2 (20,0%)
0,50 ≤ WHtR <0,60	11 (39,3%)	8 (44,4%)	3 (30,0%)
WHtR ≥0,60	8 (28,6%)	3 (16,7%)	5 (50,0%)

WHtR ≥ 0,50: 19 из 28 пациентов (67,9%).

Рисунок 4. Индивидуальные значения ИМТ и WHtR у мужчин и женщин

Каждая точка соответствует одному пациенту.




Таблица 18. Длительность заболевания в общей группе и по полу

n (%). Длительность в календарных годах относительно 2026 года.

Длительность	Все, n = 28	Мужчины, n = 18	Женщины, n = 10
Начало в 2026 году	9 (32,1%)	7 (38,9%)	2 (20,0%)
1–4 календарных года	15 (53,6%)	9 (50,0%)	6 (60,0%)
5–9 календарных лет	1 (3,6%)	0 (0,0%)	1 (10,0%)
10 лет и более	3 (10,7%)	2 (11,1%)	1 (10,0%)

Начало симптомов в 2026 году: 9 из 28 пациентов.

Таблица 19. Корреляции Спирмена для основных антропометрических характеристик

Коэффициент ρ Спирмена. Поправка Бенджамини–Хохберга.

Пара показателей	ρ	p	p с поправкой
Возраст — ИМТ	0,467	0,0123	0,0184
Возраст — WHtR	0,689	<0,0001	0,0003
Длительность заболевания — ИМТ	0,247	0,2060	0,2471
Длительность заболевания — WHtR	0,226	0,2483	0,2483
Обхват запястья — ИМТ	0,580	0,0012	0,0024
Обхват запястья — WHtR	0,602	0,0007	0,0021

Таблица 20. Ассоциации пола и возраста с ИМТ и WHtR в линейных моделях

OLS с робастными стандартными ошибками HC3. β и 95% ДИ.

Исход	Фактор	β [95% ДИ]	p	p с поправкой
ИМТ, кг/м²	Женский пол	1,36 [-4,70; 7,42]	0,6486	0,8648
ИМТ, кг/м²	Возраст, +10 лет	1,21 [-0,09; 2,51]	0,0661	0,1321
WHtR	Женский пол	-0,0036 [-0,0972; 0,0900]	0,9373	0,9373
WHtR	Возраст, +10 лет	0,0319 [0,0139; 0,0499]	0,0012	0,0048

Возраст связан с WHtR с учётом пола, p с поправкой = 0,0048.

Выводы

Соматотипологическая характеристика исследуемой группы.



50,0%

Нормостенический тип
в общей группе



59,1%

Нормостенический тип
среди пациентов с экземой

Таблица 21. Индивидуальные антропометрические измерения всех пациентов

Приложение. Часть 1 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P001	Ж	72	156,0	80,0	16,0	109,0	30,0
P002	Ж	69	167,0	100,0	20,0	112,0	31,0
P003	Ж	80	165,0	60,0	17,0	92,0	30,0
P004	М	24	175,0	55,0	15,5	73,0	30,0
P005	Ж	78	164,0	88,0	17,0	109,0	32,0
P009	М	52	175,0	88,0	18,0	100,0	35,0
P013	М	78	176,0	90,0	20,0	123,0	34,0

Таблица 21. Индивидуальные антропометрические измерения всех пациентов

Приложение. Часть 2 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P021	М	55	180,0	80,0	18,0	95,0	38,0
P022	М	36	175,0	74,0	18,0	86,0	42,0
P026	М	76	165,0	118,0	24,0	134,5	45,0
P036	М	35	194,0	85,0	19,0	93,0	52,0
P039	М	21	178,0	76,0	17,0	84,0	52,0
P043	Ж	49	165,0	55,0	15,0	74,0	50,0
P045	М	80	168,0	64,0	16,0	93,0	36,0

Таблица 21. Индивидуальные антропометрические измерения всех пациентов

Приложение. Часть 3 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P048	Ж	73	160,0	83,0	18,5	116,0	45,0
P052	М	35	171,0	80,0	19,5	93,0	38,0
P053	М	19	170,0	63,0	17,0	77,0	31,0
P057	М	34	184,0	96,0	17,5	97,0	34,0
P067	М	27	182,0	75,0	17,5	83,0	48,0
P068	М	30	186,0	65,0	17,0	87,0	35,0
P069	М	73	182,0	75,0	17,5	93,0	35,0

Таблица 21. Индивидуальные антропометрические измерения всех пациентов

Приложение. Часть 4 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P070	М	86	175,0	76,0	19,0	104,0	31,0
P071	Ж	77	162,0	80,0	17,5	83,0	35,0
P072	Ж	74	164,0	86,0	18,0	86,0	36,0
P078	М	54	178,0	100,0	19,0	111,0	50,0
P084	Ж	31	166,0	65,0	15,0	79,0	44,0
P088	М	22	179,0	86,0	19,0	95,0	50,0
P095	Ж	78	162,0	90,0	19,5	127,0	33,0

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 1 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P001	Экзема нуммулярная	32	32,87	0,699	Нормостенический
P002	Аллергический дерматит	0	35,86	0,671	Гиперстенический
P003	Экзема микробная	1	22,04	0,558	Нормостенический
P004	Крапивница	0	17,96	0,417	Астенический
P005	Экзема микробная	2	32,72	0,665	Нормостенический

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 2 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P009	Экзема микробная	0	28,73	0,571	Нормостенический
P013	Экзема микробная	1	29,05	0,699	Нормостенический
P021	Экзема микробная	0	24,69	0,528	Нормостенический
P022	Экзема микробная	1	24,16	0,491	Нормостенический
P026	Экзема микробная	15	43,34	0,815	Гиперстенический

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 3 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P036	Экзема микробная	1	22,58	0,479	Нормостенический
P039	Атопический дерматит	1	23,99	0,472	Астенический
P043	Экзема форма не уточнена	1	20,20	0,448	Нормостенический
P045	Экзема микробная	1	22,68	0,554	Астенический
P048	Экзема варикозная	1	32,42	0,725	Гиперстенический

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 4 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P052	Экзема микробная	0	27,36	0,544	Нормостенический
P053	Экзема микробная	0	21,80	0,453	Астенический
P057	Экзема микробная	0	28,36	0,527	Астенический
P067	Атопический дерматит	19	22,64	0,456	Астенический
P068	Экзема микробная	0	18,79	0,468	Астенический

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 5 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P069	Экзема микробная	1	22,64	0,511	Астенический
P070	Экзема микробная	1	24,82	0,594	Нормостенический
P071	Экзема микробная	0	30,48	0,512	Гиперстенический
P072	Экзема микробная	7	31,98	0,524	Гиперстенический
P078	Аллергический дерматит	1	31,56	0,624	Нормостенический

Таблица 22. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы всех пациентов

Приложение. Часть 6 из 6. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P084	Экзема себорейная	3	23,59	0,476	Нормостенический
P088	Экзема форма не уточнена	1	26,84	0,531	Нормостенический
P095	Аллергический дерматит	1	34,29	0,784	Гиперстенический

Таблица 23. Индивидуальные антропометрические измерения мужчин

Приложение. Часть 1 из 3. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P004	M	24	175,0	55,0	15,5	73,0	30,0
P009	M	52	175,0	88,0	18,0	100,0	35,0
P013	M	78	176,0	90,0	20,0	123,0	34,0
P021	M	55	180,0	80,0	18,0	95,0	38,0
P022	M	36	175,0	74,0	18,0	86,0	42,0
P026	M	76	165,0	118,0	24,0	134,5	45,0

Таблица 23. Индивидуальные антропометрические измерения мужчин

Приложение. Часть 2 из 3. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P036	M	35	194,0	85,0	19,0	93,0	52,0
P039	M	21	178,0	76,0	17,0	84,0	52,0
P045	M	80	168,0	64,0	16,0	93,0	36,0
P052	M	35	171,0	80,0	19,5	93,0	38,0
P053	M	19	170,0	63,0	17,0	77,0	31,0
P057	M	34	184,0	96,0	17,5	97,0	34,0

Таблица 23. Индивидуальные антропометрические измерения мужчин

Приложение. Часть 3 из 3. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P067	M	27	182,0	75,0	17,5	83,0	48,0
P068	M	30	186,0	65,0	17,0	87,0	35,0
P069	M	73	182,0	75,0	17,5	93,0	35,0
P070	M	86	175,0	76,0	19,0	104,0	31,0
P078	M	54	178,0	100,0	19,0	111,0	50,0
P088	M	22	179,0	86,0	19,0	95,0	50,0

Таблица 24. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы мужчин

Приложение. Часть 1 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P004	Крапивница	0	17,96	0,417	Астенический
P009	Экзема микробная	0	28,73	0,571	Нормостенический
P013	Экзема микробная	1	29,05	0,699	Нормостенический
P021	Экзема микробная	0	24,69	0,528	Нормостенический
P022	Экзема микробная	1	24,16	0,491	Нормостенический

Таблица 24. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы мужчин

Приложение. Часть 2 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P026	Экзема микробная	15	43,34	0,815	Гиперстенический
P036	Экзема микробная	1	22,58	0,479	Нормостенический
P039	Атопический дерматит	1	23,99	0,472	Астенический
P045	Экзема микробная	1	22,68	0,554	Астенический
P052	Экзема микробная	0	27,36	0,544	Нормостенический

Таблица 24. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы мужчин

Приложение. Часть 3 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P053	Экзема микробная	0	21,80	0,453	Астенический
P057	Экзема микробная	0	28,36	0,527	Астенический
P067	Атопический дерматит	19	22,64	0,456	Астенический
P068	Экзема микробная	0	18,79	0,468	Астенический
P069	Экзема микробная	1	22,64	0,511	Астенический

Таблица 24. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы мужчин

Приложение. Часть 4 из 4. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P070	Экзема микробная	1	24,82	0,594	Нормостенический
P078	Аллергический дерматит	1	31,56	0,624	Нормостенический
P088	Экзема форма не уточнена	1	26,84	0,531	Нормостенический

Таблица 25. Индивидуальные антропометрические измерения женщин

Приложение. Часть 1 из 2. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P001	Ж	72	156,0	80,0	16,0	109,0	30,0
P002	Ж	69	167,0	100,0	20,0	112,0	31,0
P003	Ж	80	165,0	60,0	17,0	92,0	30,0
P005	Ж	78	164,0	88,0	17,0	109,0	32,0
P043	Ж	49	165,0	55,0	15,0	74,0	50,0

Таблица 25. Индивидуальные антропометрические измерения женщин

Приложение. Часть 2 из 2. Обезличенные коды пациентов.

Код	Пол	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	Запястье, см	Талия, см	Плечевой показатель, см
P048	Ж	73	160,0	83,0	18,5	116,0	45,0
P071	Ж	77	162,0	80,0	17,5	83,0	35,0
P072	Ж	74	164,0	86,0	18,0	86,0	36,0
P084	Ж	31	166,0	65,0	15,0	79,0	44,0
P095	Ж	78	162,0	90,0	19,5	127,0	33,0

Таблица 26. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы женщин

Приложение. Часть 1 из 2. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P001	Экзема нуммулярная	32	32,87	0,699	Нормостенический
P002	Аллергический дерматит	0	35,86	0,671	Гиперстенический
P003	Экзема микробная	1	22,04	0,558	Нормостенический
P005	Экзема микробная	2	32,72	0,665	Нормостенический
P043	Экзема форма не уточнена	1	20,20	0,448	Нормостенический

Таблица 26. Индивидуальные расчётные индексы и конституциональные типы женщин

Приложение. Часть 2 из 2. Обезличенные коды пациентов.

Код	Диагноз и форма	Длительность, лет	ИМТ, кг/м²	WHtR	Тип
P048	Экзема варикозная	1	32,42	0,725	Гиперстенический
P071	Экзема микробная	0	30,48	0,512	Гиперстенический
P072	Экзема микробная	7	31,98	0,524	Гиперстенический
P084	Экзема себорейная	3	23,59	0,476	Нормостенический
P095	Аллергический дерматит	1	34,29	0,784	Гиперстенический

Благодарим за внимание!

Научный руководитель: д. мед. н., проф. Проценко Т.В.

Докладчики: Загоруйко В.В., Ерёменко В.А.